

Xulane[®]
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

Obtenga más información sobre el **parche anticonceptivo semanal.**

XULANE se aplica una vez por semana durante 3 semanas.

El parche no se aplica en la semana 4.

Revise su parche todos los días para asegurarse de que todos los bordes estén bien pegados.

Para mujeres con índice de masa corporal (IMC) de menos de 30 kg/m².

Consulte las *Limitaciones de uso adicionales a continuación.*



Escanee el código para obtener más información sobre XULANE.

No es una paciente real. El parche es una ilustración artística para mostrarlo a escala.

¿Qué es XULANE?

XULANE es un parche anticonceptivo que se le receta a mujeres con IMC de menos de 30 kg/m². Contiene dos hormonas femeninas: un estrógeno llamado etinilestradiol y una progestina llamada norelgestromina.

Las hormonas de XULANE entran al torrente sanguíneo y son procesadas por el cuerpo de manera diferente a las hormonas de las píldoras anticonceptivas. **Al usar XULANE, usted estará expuesta aproximadamente a 60 % más estrógenos que si tomara una píldora anticonceptiva ordinaria de 35 µg (microgramos) de estrógeno.** En general, la dosis de estrógeno más alta puede aumentar el riesgo de efectos secundarios.

Limitaciones de uso: la eficacia de XULANE puede disminuir en las mujeres de más de 198 libras (90 kg). Si pesa más de 198 libras (90 kg), consulte a su profesional de la salud para determinar cuál método anticonceptivo es el más adecuado para usted.

No use XULANE si su índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

ADVERTENCIA en recuadro

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de XULANE?

No use XULANE si fuma cigarrillos y tiene más de 35 años. Fumar aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios cardiovasculares serios asociados a los métodos anticonceptivos hormonales, como un infarto cardíaco, formación de coágulos sanguíneos o un accidente cerebrovascular (embolia). Este riesgo aumenta con la edad y la cantidad de cigarrillos que se fuma.

No use XULANE si tiene alto riesgo de formación de coágulos sanguíneos.

No use XULANE si su índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más. Las mujeres con IMC de 30 kg/m² o más que usan XULANE pueden tener riesgo más alto de formación de coágulos sanguíneos que las mujeres con IMC de menos de 30 kg/m².

XULANE no protege contra la infección por el VIH (SIDA) y otras infecciones de transmisión sexual.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Conozca el parche XULANE

¿Busca una opción anticonceptiva diferente?

Conozca XULANE: es un parche anticonceptivo que se les receta a mujeres con IMC de menos de 30 kg/m²

XULANE es un parche anticonceptivo semanal que se aplica en la parte superior externa del brazo, el abdomen, los glúteos o la espalda, en un lugar donde no se frote contra la ropa ajustada. El parche XULANE se aplica en ciclos de 4 semanas. El parche se aplica una vez por semana durante 3 semanas. La semana 4, cuando se espera el periodo menstrual, es la semana sin parche. El parche XULANE debe estar bien pegado a la piel para que funcione correctamente; por eso debe revisar su parche todos los días y asegurarse de que esté correctamente adherido. En estudios clínicos de un producto similar que contiene NGMN/EE, alrededor del 2 % de los parches se despegan por completo y 3 % se despegan parcialmente. Hable con su profesional de la salud si tiene dudas o preguntas sobre el uso del parche XULANE.

Las posibilidades de quedar embarazada dependen de qué tan estrictamente siga las instrucciones de uso de XULANE. En los estudios clínicos de un producto similar que contiene NGMN/EE, entre una y dos de cada 100 mujeres quedaron embarazadas durante el primer año de uso del parche de NGMN/EE conforme a las instrucciones. La eficacia de XULANE para prevenir el embarazo podría disminuir en las mujeres que pesan más de 198 libras (90 kg). Si pesa más de 198 libras (90 kg), consulte a su profesional de la salud para determinar cuál método anticonceptivo es el más adecuado para usted. No use XULANE si su IMC es de 30 kg/m² o más.

Esta no es una lista completa de los motivos por los cuales XULANE podría no ser la opción adecuada para usted. Para obtener más información, consulte la explicación “¿Quiénes no deben usar XULANE?” a continuación, en la barra rosada.

Los métodos anticonceptivos hormonales, como XULANE, contribuyen a disminuir la probabilidad de quedar embarazada. No protegen contra el VIH (SIDA) ni otras infecciones de transmisión sexual.¹

NGMN: norelgestromina. EE: etinilestradiol.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Limitaciones de uso: la eficacia de XULANE puede disminuir en las mujeres de más de 198 libras (90 kg). Si pesa más de 198 libras (90 kg), consulte a su profesional de la salud para determinar cuál método anticonceptivo es el más adecuado para usted.

No use XULANE si su índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

¿Quiénes no deben usar XULANE?

No use XULANE si tiene o ha tenido coágulos de sangre; un problema hereditario que ocasiona que su sangre sea más propensa a coagular de lo normal; antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o ciertos

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Xulane[®]
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

99 % de eficacia*

Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.

En estudios clínicos sobre un producto similar que contiene NGMN/EE, entre una y dos de cada 100 mujeres quedaron embarazadas durante el primer año de uso de acuerdo con las instrucciones.

* Consulte las Limitaciones de uso



Not an actual patient. Patch shown to scale.

problemas en las válvulas o el ritmo del corazón que pudieran provocar formación de coágulos sanguíneos en el corazón; hipertensión arterial fuera de control con medicamentos; diabetes con afectación de riñones, ojos, nervios o vasos sanguíneos; ciertos tipos de dolores de cabeza intensos, de tipo migrañoso y con aura, adormecimiento, debilidad o cambios en la visión, o cualquier tipo de migraña si tiene más de 35 años; IMC de 30 kg/m² o más; enfermedad hepática o tumores en el hígado; sangrado vaginal inexplicable; si ha tenido cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer que sea sensible a las hormonas femeninas; si toma medicamentos para la hepatitis C que contengan ombitasvir, paritaprevir o ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática ALT en la sangre; o si está o pudiera estar embarazada.

Medidas de XULANE

El parche XULANE puede ser más pequeño de lo que usted supone

Con solo 1,5" x 1,5", es poco más grande que una moneda de 25 centavos. Además, puede elegir entre cuatro opciones para ponérselo, incluso debajo de la ropa.¹ Consulte las páginas 6-7 para ver en dónde puede aplicarse XULANE.



Para obtener
más
información

Xulane.com

Xulane®
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day



Not an actual patient. Patch shown to scale.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de usar XULANE:

Informe a su profesional de la salud acerca de todas las afecciones médicas que padezca, como:

- Si está embarazada o cree que lo está.
- Si tiene una cirugía programada, ya que XULANE podría aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos después de esta. Debe suspender el uso del parche XULANE al menos 4 semanas antes de la cirugía y aguardar al menos 2 semanas después de esta.
- Si tiene análisis de laboratorio programados, ya que ciertos análisis de sangre pueden verse afectados por XULANE.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

- Si alguna vez la piel o los ojos se le pusieron amarillos durante un embarazo o por el uso de otro método anticonceptivo hormonal.
- Si está amamantando o planifica amamantar. XULANE puede reducir la cantidad de leche producida y, además, es posible que una pequeña cantidad de las hormonas de XULANE pasen a la leche materna.

Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos y productos a base de hierbas que esté tomando, incluidos los recetados para convulsiones o terapia de reemplazo tiroideo, ya que algunos de estos pueden requerir un ajuste de dosis o reducir la efectividad de XULANE. Al usar medicamentos que pudieran disminuir la eficacia del parche XULANE, utilice otro método anticonceptivo (por ejemplo, un preservativo o diafragma con espermicida).

Algunos medicamentos y el jugo de toronja (pomelo) pueden aumentar la concentración de la hormona etinilestradiol si se usan junto con XULANE.

¿Dónde se coloca el parche XULANE?

XULANE puede adherir en la parte superior externa del brazo, el abdomen, los glúteos o la espalda, en un lugar donde no se frote contra la ropa ajustada. Revise el parche todos los días para asegurarse de que todos los bordes estén bien pegados. Aplíquelo únicamente sobre piel limpia y seca. El parche debe estar bien pegado a la piel para funcionar correctamente. **No lo coloque sobre las mamas (senos), sobre piel con cortaduras o irritada, ni en el mismo lugar de la piel que el parche anterior. No aplique lociones, cremas, aceites, polvos o maquillaje en el lugar del parche. No vuelva a aplicar un parche que ya no tiene pegamento. No fije el parche con cinta adhesiva ni envuelva su piel con el parche.**¹



Para obtener instrucciones detalladas, consulte las instrucciones paso a paso de uso de XULANE en la sección de Información para el paciente del Breve resumen de información para el consumidor adjunto, incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Visit [Xulane.com](https://www.xulane.com)

* Patch is an artistic rendition shown to scale.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de XULANE?

Los efectos secundarios más frecuentemente reportados por al menos 5 % de las mujeres durante los estudios clínicos fueron: síntomas mamarios (molestias, hinchazón o dolor); náuseas y vómito; dolor de cabeza; irritación, enrojecimiento, dolor o hinchazón en la piel; comezón o sarpullido en el lugar de aplicación del parche; dolor de estómago; dolor durante la menstruación; sangrado vaginal y trastornos menstruales, como escurrimiento o sangrado entre periodos; y trastornos anímicos, afectivos y de ansiedad.

Informe a su profesional de la salud sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XULANE. Para obtener más información, consulte a su profesional de la salud o al farmacéutico. **Llame a su profesional de la salud para que le oriente sobre los efectos secundarios.**

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

6



La exhortamos a que notifique a la FDA todo efecto secundario negativo de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Los métodos anticonceptivos hormonales provocan cáncer?

Se desconoce si los métodos anticonceptivos hormonales provocan cáncer. Algunos estudios, pero no todos, sugieren que podría haber un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales con una mayor duración del uso.

Las mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales pueden tener una probabilidad ligeramente mayor de contraer cáncer de cuello uterino. Sin embargo, esto puede deberse a otros motivos, como tener más parejas sexuales.

Esta no es toda la información que debe leer antes de usar XULANE. Consulte el Breve resumen de información para el consumidor adjunto, incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

7

¿Cuáles son los riesgos más serios de usar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios serios, como formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo, como ser fumadora, obesa o tener más de 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de la visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro). **Estos padecimientos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.**

El riesgo de formación de coágulos sanguíneos es más alto cuando se usa XULANE por primera vez y al volver a usar XULANE u otro anticonceptivo hormonal distinto, después de una pausa de un mes o más.

En algunos estudios se ha informado que las mujeres que usan sistemas transdérmicos de NGMN/EE tienen mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Hable con su profesional de la salud acerca del riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo antes de usar XULANE, o para decidir cuál tipo de método anticonceptivo es adecuado para usted.

Estos no son todos los riesgos del uso de XULANE. Consulte las páginas 20-21 de este folleto, donde encontrará información de seguridad adicional, y hable con su profesional de la salud sobre los beneficios y riesgos de usar XULANE.¹

NGMN: Norelgestromina. EE: Etinilestradiol.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)


¿Cuáles son los riesgos más serios de usar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios serios, como formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo, como ser fumadora, obesa o tener más de 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de la visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro). **Estos padecimientos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.**

El riesgo de formación de coágulos sanguíneos es más alto cuando se usa XULANE por primera vez y al volver a usar XULANE u otro anticonceptivo hormonal distinto, después de una pausa de un mes o más. Algunos estudios han informado que las mujeres que

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Xulane[®]
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day



Actor Portrayal.

usan sistemas transdérmicos con norelgestromina y etinilestradiol corren un riesgo más alto de sufrir coágulos sanguíneos. Hable con su profesional de la salud acerca del riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo antes de usar XULANE, o para decidir cuál tipo de método anticonceptivo es adecuado para usted.

Llame inmediatamente a su profesional de la salud si tiene:

Dolor en las piernas que no se calma; falta de aliento repentina; ceguera repentina, sea parcial o total; dolor severo o presión en el pecho; dolor de cabeza repentino y severo, distinto de los dolores de cabeza habituales; debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna, o dificultad para hablar; coloración amarilla de la piel o los ojos.

Estos son otros riesgos serios:

Problemas hepáticos como tumores hepáticos, problemas en la vesícula biliar o hipertensión arterial.

¿Soy apta para usar parches?*

XULANE no es para todas las mujeres. Debe hablar con su profesional de la salud sobre sus antecedentes médicos individuales, riesgos de salud y decisiones de estilo de vida para determinar si el parche XULANE puede ser adecuado para usted.¹

¿Sabe usted lo que espera de su anticonceptivo?

ESPERO

 Ayudar a prevenir el embarazo en esta etapa de mi vida

 Explorar mis opciones anticonceptivas

 Mantener abiertas mis opciones de planificación familiar

* Los factores anteriores no son los únicos a considerar para determinar si el parche XULANE podría ser apropiado para sus necesidades anticonceptivas particulares. Hable con su profesional de la salud sobre los riesgos y beneficios de todas sus opciones.

No use XULANE si fuma y tiene más de 35 años, o si:

- ha tenido coágulos sanguíneos;
- tiene un problema hereditario que ocasiona que su sangre sea más propensa a coagular de lo normal;
- tiene antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o ciertos problemas en las válvulas o el ritmo del corazón que pudieran provocar formación de coágulos sanguíneos en el corazón;
- padece de hipertensión que no puede controlarse con medicamentos;
- padece de diabetes acompañada de daño renal, ocular, nervioso o en los vasos sanguíneos;
- ha tenido ciertos tipos de migrañas (jaquecas) graves acompañadas de aura, entumecimiento, debilidad o cambios en la vista, o cualquier tipo de migraña y tiene más de 35 años;
- tiene un IMC de 30 kg/m² o más;
- padece una enfermedad hepática o tumores en el hígado;
- tiene sangrado vaginal sin causa aparente;
- está embarazada o cree que podría estarlo;
- ha tenido cáncer de mama o cualquier otro cáncer que sea sensible a las hormonas femeninas;
- toma medicamentos para la hepatitis C que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática ALT en la sangre.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Limitaciones de uso: la eficacia de XULANE puede disminuir en las mujeres de más de 198 libras (90 kg). Si pesa más de 198 libras (90 kg), consulte a su profesional de la salud para determinar cuál método anticonceptivo es el más adecuado para usted.

No use XULANE si su índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

¿Quiénes no deben usar XULANE?

No use XULANE si tiene o ha tenido: coágulos sanguíneos; algún problema hereditario que haga que su sangre coagule más de lo normal; antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular (embolia) o ciertos problemas con las válvulas o el ritmo del corazón que pudieran causar formación de coágulos

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

sanguíneos en el corazón; hipertensión arterial fuera de control con medicamentos; diabetes con afectación de riñones, ojos, nervios o vasos sanguíneos; ciertos tipos de dolores de cabeza intensos, de tipo migrañoso y con aura, adormecimiento, debilidad o cambios en la visión, o cualquier tipo de migraña si tiene más de 35 años; IMC de 30 kg/m² o más; enfermedad hepática o tumores en el hígado; sangrado vaginal inexplicable; si ha tenido cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer que sea sensible a las hormonas femeninas; si toma medicamentos para la hepatitis C que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática ALT en la sangre; o si está o pudiera estar embarazada.

¿Cómo comienzo a usar XULANE?

Xulane®
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

Si actualmente no usa ningún anticonceptivo hormonal, hay dos opciones para comenzar con el parche. Elija la opción más adecuada para usted:

Inicio del primer día

Aplique el primer parche durante las primeras 24 horas del periodo menstrual.

Inicio en domingo

Aplique el primer parche el primer domingo después del inicio del periodo menstrual. Utilice un método anticonceptivo no hormonal, como un preservativo o diafragma con espermicida, durante los primeros 7 días del primer ciclo menstrual únicamente. Si el periodo menstrual comienza el domingo, aplique el primer parche ese día; no es necesario usar un anticonceptivo de respaldo.

Si va a cambiar de píldoras o anillo vaginal anticonceptivo al parche

Complete su ciclo actual de píldoras o anillo vaginal. Aplique el primer parche el día en el que normalmente comenzaría con la siguiente píldora o se colocaría el siguiente anillo vaginal. Si no tiene su periodo menstrual en el lapso de una semana después de tomar la última píldora activa o de retirar el último anillo vaginal, consulte a su profesional de la salud para asegurarse de no estar embarazada. Aun así, puede comenzar a usar el parche anticonceptivo. Si se aplica el parche más de una semana después de tomar la última píldora activa o de retirar el último anillo vaginal, utilice un método anticonceptivo no hormonal junto con el parche durante los primeros 7 días después de la aplicación de este.

Si comienza después de dar a luz

Si no está amamantando, espere 4 semanas antes de usar el parche y utilice mientras tanto un método anticonceptivo no hormonal, como un preservativo o diafragma con espermicida, durante los primeros 7 días del primer ciclo menstrual únicamente. Si ha tenido relaciones sexuales después del parto, espere hasta tener su primera menstruación o consulte al profesional de la salud para cerciorarse de no estar embarazada antes de comenzar a usar el parche.

Uso después de un aborto inducido o espontáneo

Puede comenzar a usar el parche inmediatamente después de un aborto espontáneo o inducido durante las primeras 12 semanas (primer trimestre) del embarazo. No es necesario que utilice otro método anticonceptivo.

Si no comienza a usar el parche durante los 5 días posteriores a un aborto espontáneo o inducido durante el primer trimestre, utilice un método anticonceptivo no hormonal, como un preservativo o diafragma con espermicida, mientras espera que comience su periodo. Debe seguir las instrucciones de la izquierda para el comienzo en el primer día o en un domingo, según sea adecuado para usted, y lea la Información para el paciente completa para comenzar a usar XULANE.

Si va a comenzar a usar el parche después de un aborto espontáneo o provocado que ocurra después de 12 semanas de embarazo (segundo trimestre), espere 4 semanas antes de usar el parche y utilice un método anticonceptivo no hormonal, como un preservativo o diafragma con espermicida, durante los primeros 7 días del primer ciclo menstrual únicamente. Si ha tenido relaciones sexuales después del aborto espontáneo o provocado, espere hasta tener su primer periodo, o consulte al profesional de la salud para asegurarse de no estar embarazada antes de comenzar a usar el parche.¹

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de usar XULANE:

Informe a su profesional de la salud acerca de todas las afecciones médicas que padezca, como:

- Si está embarazada o cree que lo está.
- Si tiene una cirugía programada, ya que XULANE podría aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos después de esta. Debe suspender el uso del parche XULANE al menos 4 semanas antes de la cirugía y aguardar al menos 2 semanas después de esta.
- Si tiene análisis de laboratorio programados, ya que ciertos análisis de sangre pueden verse afectados por XULANE.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

- Si alguna vez la piel o los ojos se le pusieron amarillos durante un embarazo o por el uso de otro método anticonceptivo hormonal.
- Si está amamantando o planifica amamantar. XULANE puede reducir la cantidad de leche producida y, además, es posible que una pequeña cantidad de las hormonas de XULANE pasen a la leche materna.

Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos y productos a base de hierbas que esté tomando, incluidos los recetados para convulsiones o terapia de reemplazo tiroideo, ya que algunos de estos pueden requerir un ajuste de dosis o reducir la efectividad de XULANE. Al usar medicamentos que pudieran disminuir la eficacia del parche XULANE, utilice otro método anticonceptivo (por ejemplo, un preservativo o diafragma con espermicida).

Algunos medicamentos y el jugo de toronja (pomelo) pueden aumentar la concentración de la hormona etinilestradiol si se usan junto con XULANE.

Cómo prepararse para la aplicación de XULANE

Xulane®
(norelgestromin and ethinyl estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

Use XULANE exactamente como se lo indique su profesional de la salud. Coloque el parche en la parte superior externa del brazo, el abdomen, los glúteos o la espalda, en un lugar donde no se frote contra la ropa ajustada. Por ejemplo, no debe colocarlo debajo de la pretina de las prendas. **No** lo coloque sobre las mamas (senos), sobre piel con cortaduras o irritada, ni en el mismo lugar que el parche anterior. No corte, dañe ni altere de ninguna forma el parche XULANE.¹

Antes de la aplicación

Asegúrese de que la piel esté limpia y seca. No aplique lociones, cremas, aceites, polvos o maquillaje en el lugar del parche. Esto puede hacer que el parche no se pegue bien o se afloje.

Aplicación de XULANE



1 *No es el tamaño real.
El parche se ha ajustado a escala.

Abra el envase por el borde superior y uno de los bordes laterales. Abra la bolsa de aluminio y retire con cuidado el contenido de la misma, desechando los trozos de película adicionales de arriba y abajo del parche.



2 *No es el tamaño real.
El parche se ha ajustado a escala.

Retire el plástico transparente hasta la mitad. Evite tocar la superficie adherible con los dedos.



3 *No es el tamaño real.
El parche se ha ajustado a escala.

Aplique el lado del pegamento del parche sobre la piel limpia y seca. Retire la otra mitad del plástico transparente y termine de pegar el parche sobre la piel.

Revise su parche todos los días para asegurarse de que todos los bordes estén bien pegados.

[Visit Xulane.com](http://VisitXulane.com)



4 *No es el tamaño real.
El parche se ha ajustado a escala.

Presione firmemente el parche con la palma de la mano durante 10 segundos, para asegurarse de que la totalidad del parche se adhiera a la piel. Pase los dedos por toda la superficie para eliminar cualquier "arruga" alrededor de los bordes exteriores del parche.

El parche XULANE debe estar bien pegado a la piel para funcionar correctamente.

Cómo debo usar XULANE

Use un parche XULANE a la vez. Asegúrese de retirar el parche usado antes de aplicar uno nuevo. **No** omita el uso de ningún parche XULANE, incluso

si no tiene relaciones sexuales con frecuencia. XULANE se aplica en ciclos de 4 semanas.

Consulte la página 16 para obtener más información sobre cómo usar XULANE.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cuáles son los riesgos más serios de usar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios serios, como formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo, como ser fumadora, obesa o tener más de 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de la visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro). Estos padecimientos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.

El riesgo de formación de coágulos sanguíneos es más alto cuando se usa XULANE por primera vez y al volver a usar XULANE u otro anticonceptivo hormonal distinto, después de una pausa de un mes o más. Algunos estudios han informado que las mujeres que usan sistemas transdérmicos con norelgestromina y etinilestradiol corren un riesgo más alto de sufrir coágulos sanguíneos. Hable con su profesional de la salud acerca del riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo antes de usar XULANE, o para decidir cuál tipo de método anticonceptivo es adecuado para usted.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Cómo debo usar XULANE (continuación)

- Aplique el parche una vez por semana durante 3 semanas (21 días en total).
- Aplique cada nuevo parche el mismo día de la semana. Este será su “Día de cambio de parche”. Por ejemplo, si se aplica el primer parche un lunes, todos los parches deben aplicarse en lunes.
- No se aplique el parche en la semana 4. Asegúrese de retirar el parche usado. Esta es la semana sin parche. El periodo menstrual debe presentarse durante la semana sin parche.
- Comience el nuevo ciclo de 4 semanas aplicando un nuevo parche el día después de que termine la semana 4. Repita el ciclo de 3 aplicaciones semanales seguidas por una semana sin parche.
- El parche nunca debe quitarse por más de 7 días consecutivos. Si se quita el parche por más de 7 días consecutivos y tiene relaciones sexuales durante ese periodo, puede quedar embarazada.
- Si no se presenta un periodo menstrual, puede quedar embarazada. Algunas mujeres no tienen periodos o tienen periodos leves cuando usan anticonceptivos hormonales, incluso si no están embarazadas. Llame a su profesional de la salud si no se presenta un periodo y no ha usado el parche todos los días, o si no se presentan dos periodos consecutivos.

Si el parche XULANE le causa molestias o el lugar de aplicación está enrojecido, hinchado o dolorido, retire el parche y aplique uno nuevo en otro lugar hasta el próximo “Día de cambio de parche”.

Para desechar el parche XULANE, dóblelo a la mitad por el lado con pegamento, colóquelo en un contenedor resistente a prueba de niños y tírelo en la basura. Los parches XULANE usados no deben desecharse en el inodoro.

Almacénelos a temperatura ambiente, entre 68 y 77 °F (20 y 25 °C). No los guarde en el refrigerador o el congelador.¹

Xulane[®]
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day



Para obtener información sobre qué hacer si los bordes del parche XULANE se levantan o el parche se despega parcial o totalmente, lea la Información para el paciente en el Breve resumen de información para el consumidor adjunto.

No es una paciente real. El parche se muestra a escala.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Llame inmediatamente a su profesional de la salud si tiene:

Dolor en las piernas que no se calma; falta de aliento repentina; ceguera repentina, sea parcial o total; dolor severo o presión en el pecho; dolor de cabeza repentino y severo, distinto de los dolores de cabeza habituales; debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna, o dificultad para hablar; coloración amarilla de la piel o los ojos.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Estos son otros riesgos serios:

Problemas hepáticos como tumores hepáticos, problemas en la vesícula biliar o hipertensión arterial.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de XULANE?

Los efectos secundarios más frecuentemente reportados por al menos 5 % de las mujeres durante los estudios clínicos fueron: síntomas mamarios (molestias, hinchazón o dolor); náuseas y vómito; dolor de cabeza; irritación, enrojecimiento, dolor o hinchazón en la piel; comezón o sarpullido en el lugar de aplicación del parche; dolor de estómago; dolor durante la menstruación; sangrado vaginal y trastornos menstruales, como escurrimiento o sangrado entre periodos; y trastornos anímicos, afectivos y de ansiedad.

Cambiar de otro método anticonceptivo al parche XULANE

Xulane®
(norelgestromin and ethinyl estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

Píldora anticonceptiva hormonal combinada por vía oral

- Si está cambiando de la píldora a XULANE, debe completar el ciclo actual de píldoras y aplicarse el primer parche XULANE el día en el que normalmente comenzaría con su próxima píldora.
- Si no comienza su período dentro de la semana después de tomar la última píldora activa, debe consultar con su profesional de la salud para asegurarse de que no esté embarazada, pero sí puede comenzar a usar XULANE como método anticonceptivo.
- Si se aplica el parche más de una semana después de tomarse la última píldora activa, debe usar un método anticonceptivo no hormonal como refuerzo (por ejemplo, preservativos con espermicida o diafragma con espermicida) en conjunto con XULANE durante los primeros 7 días del uso del parche.

Parche anticonceptivo

- Si está cambiando de otro parche anticonceptivo a XULANE, debe completar el ciclo actual del parche y aplicarse el primer parche XULANE el día en el que normalmente comenzaría el ciclo de próximo parche.
- Si no comienza su período dentro de la semana después de retirar el último parche, debe consultar con su profesional de la salud para asegurarse de que no esté embarazada, pero sí puede comenzar a usar XULANE como método anticonceptivo.
- Si se aplica XULANE más de una semana después de retirar el último parche, debe usar un método anticonceptivo no hormonal como refuerzo (por ejemplo, preservativos con espermicida o diafragma con espermicida) en conjunto con XULANE durante los primeros 7 días del uso del parche.

Anillo vaginal

- Si está cambiando del anillo vaginal a XULANE, debe completar el ciclo actual del anillo vaginal y aplicarse el primer parche XULANE el día en el que normalmente se colocaría su siguiente anillo vaginal.
- Si no comienza su período dentro de la semana después de retirar el último anillo vaginal, debe consultar con su profesional de la salud para asegurarse de que no esté embarazada, pero sí puede comenzar a usar XULANE como método anticonceptivo.
- Si se aplica el parche más de una semana después de retirar el último anillo vaginal, debe usar un método anticonceptivo no hormonal como refuerzo (por ejemplo, preservativos con espermicida o diafragma con espermicida) en conjunto con XULANE durante los primeros 7 días del uso del parche.

Sistema intrauterino (SIU)

- Si cambia de un sistema intrauterino a XULANE, debe aplicarse el primer parche XULANE el día en que se retira el SIU.
- Si el SIU no se retira el primer día de su ciclo menstrual, debe usar un método anticonceptivo no hormonal como refuerzo (por ejemplo, preservativos con espermicida o diafragma con espermicida) en conjunto con XULANE durante los primeros 7 días del uso del parche.

Inyección

- Si cambia de una inyección anticonceptiva a XULANE, debe aplicarse el primer parche XULANE el día en que normalmente ocurriría la próxima inyección.

Implante

- Si cambia de un implante a XULANE, debe aplicarse el primer parche XULANE el día en que se retira el implante.

Píldora de progestina sola

- Si cambia de una píldora de progestina sola a XULANE, debe aplicarse el primer parche XULANE al día siguiente en que normalmente comenzaría el próximo ciclo de la píldora de progestina sola.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Informe a su profesional de la salud sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XULANE. Para obtener más información, consulte a su profesional de la salud o al farmacéutico. **Llame a su profesional de la salud para que la oriente sobre los efectos secundarios.**

La exhortamos a que notifique a la FDA todo efecto secundario negativo de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

¿Los métodos anticonceptivos hormonales provocan cáncer?

Se desconoce si los métodos anticonceptivos hormonales provocan cáncer. Algunos estudios, pero no todos, sugieren que podría haber un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales con una mayor duración del uso.

Las mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales pueden tener una probabilidad ligeramente mayor de contraer cáncer de cuello uterino. Sin embargo, esto puede deberse a otros motivos, como tener más parejas sexuales.

Esta no es toda la información que debe leer antes de usar XULANE.

Consulte el Breve resumen de información para el consumidor adjunto, incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

¿Qué es XULANE?

XULANE es un parche anticonceptivo que se les receta a mujeres con IMC de menos de 30 kg/m². Contiene dos hormonas femeninas: un estrógeno llamado etinilestradiol y una progestina llamada norelgestromina.

Las hormonas de XULANE entran al torrente sanguíneo y son procesadas por el cuerpo de manera diferente a las hormonas de las píldoras anticonceptivas. **Al usar XULANE, usted estará expuesta aproximadamente a 60 % más estrógenos que si tomara una píldora anticonceptiva ordinaria de 35 µg (microgramos) de estrógeno.** En general, la dosis de estrógeno más alta puede aumentar el riesgo de efectos secundarios.

Limitaciones de uso:

La eficacia de XULANE puede disminuir en las mujeres de más de 198 libras (90 kg). Si pesa más de 198 libras (90 kg), consulte a su profesional de la salud para determinar cuál método anticonceptivo es el más adecuado para usted.

No use XULANE si su índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

ADVERTENCIA en recuadro

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de XULANE?

No use XULANE si fuma cigarrillos y tiene más de 35 años. Fumar aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios cardiovasculares serios asociados a los métodos anticonceptivos hormonales, como un infarto cardíaco, formación de coágulos sanguíneos o un accidente cerebrovascular (embolia). Este riesgo aumenta con la edad y la cantidad de cigarrillos que se fuma.

No use XULANE si tiene alto riesgo de formación de coágulos sanguíneos.

No use XULANE si su índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más. Las mujeres con IMC de 30 kg/m² o más que usan Xulane pueden tener riesgo más alto de formación de coágulos sanguíneos que las mujeres con IMC de menos de 30 kg/m².

XULANE no protege contra la infección por el VIH (SIDA) y otras infecciones de transmisión sexual.

¿Quiénes no deben usar Xulane?

No use Xulane si tiene o ha tenido: coágulos sanguíneos; algún problema hereditario que haga que su sangre coagule más de lo normal; antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular (embolia) o ciertos problemas con las válvulas o el ritmo del corazón que pudieran causar formación de coágulos sanguíneos en el corazón; hipertensión arterial fuera de control con medicamentos; diabetes con afectación de riñones, ojos, nervios o vasos sanguíneos; ciertos tipos de dolores de cabeza intensos, de tipo migrañoso y con aura, adormecimiento, debilidad o cambios en la visión, o cualquier tipo de migraña si tiene más de 35 años; IMC de 30 kg/m² o más; enfermedad hepática o tumores en el hígado; sangrado vaginal inexplicable; si ha tenido cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer que sea sensible a las hormonas femeninas; si toma medicamentos para la hepatitis C que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática "alanina aminotransferasa" (ALT) en la sangre; o si está o pudiera estar embarazada.

Antes de usar Xulane:

Informe a su profesional de la salud acerca de todas las afecciones médicas que padezca, como:

- Si está embarazada o cree que lo está.
- Si tiene una cirugía programada, ya que XULANE podría aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos después de esta. Debe suspender el uso del parche XULANE al menos 4 semanas antes de la cirugía y aguardar al menos 2 semanas después de esta.
- Si tiene análisis de laboratorio programados, ya que ciertos análisis de sangre pueden verse afectados por XULANE.
- Si alguna vez la piel o los ojos se le pusieron amarillos durante un embarazo o por el uso de otro método anticonceptivo hormonal.
- Si está amamantando o planifica amamantar. XULANE puede reducir la cantidad de leche producida y, además, es posible que una pequeña cantidad de las hormonas de XULANE pasen a la leche materna.

Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos y productos a base de hierbas que esté tomando, incluidos los recetados para convulsiones o terapia de reemplazo tiroideo, ya que algunos de estos pueden requerir un ajuste de dosis o reducir la efectividad de XULANE. Al usar medicamentos que pudieran disminuir la eficacia del parche XULANE, utilice otro método anticonceptivo (por ejemplo, un preservativo o diafragma con espermicida).

Algunos medicamentos y el jugo de toronja (pomelo) pueden aumentar la concentración de la hormona etinilestradiol si se usan junto con XULANE.

¿Cuáles son los riesgos más serios de usar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios serios, como formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo, como ser fumadora, obesa o tener más de 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de la visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro). **Estos padecimientos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.**

El riesgo de formación de coágulos sanguíneos es más alto cuando se usa XULANE por primera vez y al volver a usar XULANE u otro anticonceptivo hormonal distinto, después de una pausa de un mes o más. Algunos estudios han informado que las mujeres que usan sistemas transdérmicos con norelgestromina y etinilestradiol corren un riesgo más alto de sufrir coágulos sanguíneos. Hable con su profesional de la salud acerca del riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo antes de usar XULANE, o para decidir cuál tipo de método anticonceptivo es adecuado para usted.

llame inmediatamente a su profesional de la salud si tiene:

Dolor en las piernas que no se calma; falta de aliento repentina; ceguera repentina, sea parcial o total; dolor severo o presión en el pecho; dolor de cabeza repentino y severo, distinto de los dolores de cabeza habituales; debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna, o dificultad para hablar; coloración amarilla de la piel o los ojos.

Estos son otros riesgos serios:

Problemas hepáticos como tumores hepáticos, problemas en la vesícula biliar o hipertensión arterial.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de XULANE?

Los efectos secundarios más frecuentemente reportados por al menos 5 % de las mujeres durante los estudios clínicos fueron: síntomas mamarios (molestias, hinchazón o dolor); náuseas y vómito; dolor de cabeza; irritación, enrojecimiento, dolor o hinchazón en la piel; comezón o sarpullido en el lugar de aplicación del parche; dolor de estómago; dolor durante la menstruación; sangrado vaginal y trastornos menstruales, como escurrimiento o sangrado entre periodos; y trastornos anímicos, afectivos y de ansiedad. Informe a su profesional de la salud sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XULANE. Para obtener más información, consulte a su profesional de la salud o al farmacéutico. **llame a su profesional de la salud para que le oriente sobre los efectos secundarios. La exhortamos a que notifique a la FDA todo efecto secundario negativo de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.**

¿Los métodos anticonceptivos hormonales provocan cáncer?

Se desconoce si los métodos anticonceptivos hormonales provocan cáncer. Algunos estudios, pero no todos, sugieren que podría haber un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales con una mayor duración del uso. Las mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales pueden tener una probabilidad ligeramente mayor de contraer cáncer de cuello uterino. Sin embargo, esto puede deberse a otros motivos, como tener más parejas sexuales. Esta no es toda la información que debe leer antes de usar XULANE. Consulte el Breve resumen de información para el consumidor adjunto, incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Nuestro programa de Tarjeta de ahorros de XULANE

Xulane®
(norelgestromin and ethinyl
estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

Eligible patients may pay as little as \$0 for the first fill of XULANE*

and \$15 on each fill after that with the XULANE Savings Card.*

*Eligibility restrictions apply. See full Terms and Conditions below. Not valid for patients enrolled in federal or state healthcare programs, such as Medicare, Medicaid, and TRICARE, and not valid for commercial patients that may be used by commercially insured patients without coverage for Xulane®. Mylan Pharmaceuticals Inc., a Viatris Company, reserves the right to amend or end this program at any time without notice.



Esta tarjeta de ahorros no está disponible para pacientes sin seguro o pacientes que están cubiertos por un programa de atención médica financiado por el estado o el gobierno federal.

Consulte los [Términos y condiciones completos](#).



¿Qué es la tarjeta de ahorros XULANE?

Es una oferta de ahorros que puede reducir sus costos de bolsillo en las recetas de XULANE a tan solo \$0 en su primer surtido de recetas y \$15 en cada surtido de recetas posterior.



Los pacientes elegibles que tienen seguro de **salud comercial pueden recibir hasta \$100 de descuento** en el primer surtido de recetas de 28 días de XULANE. Para surtidos posteriores, los pacientes elegibles que tienen seguro de salud comercial y **pagan \$15 en cada surtido posterior, pueden recibir hasta \$25 de descuento** por cada surtido de recetas de 28 días de XULANE, hasta un máximo agregado de \$425 por año calendario.



Puede imprimir la oferta de ahorros desde su computadora o almacenarla en su teléfono inteligente y presentarla a su farmacéutico. Solo presente su tarjeta en la farmacia cada vez que entregue o renueve su receta.

XULANE® (norelgestromina y sistema transdérmico de etinilestradiol) 150/35 µg por día **Términos y condiciones de la tarjeta de ahorros**

Puede utilizar esta Tarjeta de ahorros para reducir el monto de sus costos de bolsillo por XULANE (norelgestromina y sistema transdérmico de etinilestradiol) 150/35 µg por día y \$15 por cada surtido, mientras este programa permanezca en vigencia. Esta tarjeta de ahorros se puede usar para reducir la cantidad de sus costos de bolsillo para XULANE hasta un máximo de \$100 por receta de 28 días para el primer surtido, y luego para surtidos posteriores, hasta un máximo de \$25 por receta de 28 días después de pagar los primeros \$15 por receta de 28 días, mientras este programa permanezca vigente. No es necesario realizar ninguna otra compra. Esta oferta se puede usar hasta un total de 14 surtidos (28 días) por año calendario, con un límite de ahorro agregado de \$425 por año calendario mientras este programa permanezca vigente. Se requiere una receta válida con el número de identificación del recetador. Mylan Pharmaceuticals Inc., una empresa de Viatris, se reserva el derecho de modificar o finalizar este programa en cualquier momento sin previo aviso.

Requisitos de elegibilidad: esta Tarjeta de ahorros solo puede ser canjeada por pacientes o tutores de pacientes que tengan 18 años de edad o más y que sean residentes de los Estados Unidos y sus territorios. Los pacientes deben tener un seguro comercial. Este programa no es válido para pacientes no asegurados (pero puede ser utilizado por pacientes asegurados comercialmente sin cobertura para XULANE) y pacientes que están cubiertos por cualquier programa de asistencia sanitaria financiado por el estado o el gobierno federal, incluidos, entre otros, cualquier programa estatal de asistencia farmacéutica, Medicare (Parte D o de otro modo), Medicaid, Medigap, VA o DOD, o TRICARE (independientemente de si XULANE está cubierto por dicho programa gubernamental); no es válido si el paciente es elegible para Medicare y está inscrito en un plan de salud patrocinado por el empleador u

en un programa de beneficios de recetas para jubilados; y no es válido si el plan de seguro del paciente está pagando el costo total de esta receta. Este programa es nulo fuera de los EE. UU. y sus territorios o donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o restringido. En ausencia de un cambio en la ley de Massachusetts, este programa ya no será válido para los residentes de Massachusetts después del 1 de enero de 2026. Este programa no es válido para residentes de California.

Esta Tarjeta de ahorros no es un seguro de salud. Esta Tarjeta de ahorros no es transferible, y el monto de los ahorros no puede exceder los costos de bolsillo del paciente. Esta Tarjeta de ahorros no se puede combinar con ningún otro reembolso o cupón, tarjeta de descuento en efectivo, prueba gratuita u oferta similar para la receta especificada. Esta Tarjeta de ahorros no puede canjearse por dinero en efectivo.

AVISO: Los datos relacionados con el uso de esta Tarjeta de ahorros pueden recopilarse, analizarse y compartirse con Mylan Pharmaceuticals Inc., una compañía de Viatris, para estudios de mercado y demás fines relacionados con la evaluación de programas de cupones. Los datos compartidos con Mylan Pharmaceuticals Inc., una compañía de Viatris, se agregarán y anonimizarán, lo que significa que se combinarán con datos relacionados con otros canjes de tarjetas de ahorro y no lo identificarán.

Instrucciones para el paciente: Al usar esta Tarjeta de ahorros, acepta y se compromete a cumplir estas condiciones. Además, reconoce y acepta que actualmente cumple con los criterios de elegibilidad y otros requisitos aquí descritos cada vez que utilice esta Tarjeta de ahorros y que comprende y cumplirá con los siguientes términos y condiciones adicionales:

- No ha presentado y no presentará una reclamación de reembolso bajo ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta receta.
- Su uso de esta Tarjeta de ahorros debe ser coherente con los términos de cualquier beneficio de medicamentos proporcionado por su aseguradora de salud comercial, plan de salud o pagador externo privado. Acepta informar el uso de esta Tarjeta de ahorros a su aseguradora comercial si es necesario.
- Cuando sea necesario, se debe presentar a su farmacéutico una Tarjeta de ahorros y una tarjeta de seguro de medicamentos recetados, junto con una receta válida para XULANE.
- Si comienza a recibir beneficios de medicamentos recetados de cualquier programa financiado por el gobierno, se le retirará de este programa de Tarjeta de ahorros.

Instrucciones para el farmacéutico: cuando acepta esta Tarjeta de ahorros, está certificando que ha recibido esta Tarjeta de ahorros de un paciente elegible; ha recibido una receta válida para XULANE para un paciente elegible; ha dispensado el producto como se indica; no ha presentado ni presentará una reclamación de reembolso bajo ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta receta; y de lo contrario cumplirá con estos términos, y todos los términos y condiciones aplicables. Además, certifica que su participación en este programa es coherente con todas las leyes estatales aplicables y cualquier obligación, contractual o de otro tipo, que tenga como proveedor de farmacia, y que informará el uso de esta Tarjeta de ahorros a la aseguradora del paciente si es necesario.

- Envíe la transacción a McKesson Corporation usando el número BIN 610524.
- Para los pacientes con seguro comercial, ingrese esta información de la Tarjeta de ahorros como cobertura secundaria y transmitala utilizando el segmento COB de la transacción NCPDP. Los ahorros del paciente aplicables se mostrarán en la respuesta de la transacción. Las tarjetas de descuento en efectivo no son válidas como seguro principal en virtud de esta oferta.
- La aceptación de esta Tarjeta de ahorros y su presentación de solicitudes de reembolso para el programa de la Tarjeta de ahorros de Xulane están sujetas a los Términos y Condiciones de la Tarjeta de ahorros publicados en www.activatethecard.com/viatrisadvocate/xulane/welcome#nc.
- La aceptación de esta Tarjeta de ahorros y su presentación de solicitudes de reembolso para el programa de ahorros de XULANE están sujetas a los Términos y Condiciones del programa LoyaltyScript® publicados en www.mckesson.com/mprstnc.
- Para preguntas relacionadas con el establecimiento, la transmisión de reclamaciones, la elegibilidad del paciente u otros asuntos, llame a LoyaltyScript® para el programa de Tarjeta de ahorros de XULANE al 800-657-7613 (de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este, de lunes a viernes).

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Xulane®

(norelgestromin and ethinyl estradiol transdermal system)
150/35 mcg per day

Solicítele a su médico que indique “entréguese como se receta” (Dispense As Written, DAW)* o los términos que se usen en su estado (según corresponda) en todas las recetas de XULANE para saber que está recibiendo el mismo parche XULANE que le han recetado; parche a parche, mes a mes.

Algunas farmacias pueden preparar la receta de XULANE con un genérico diferente y podría no estar obligada a notificarlo.

Verifique su bolsa antes de irse de la farmacia para asegurar que está recibiendo XULANE. Si piensa que su receta fue cambiada, hable con su farmacéutico. Podría recibir el parche XULANE como lo recetó su médico.

Rx

Xulane Transdermal Patch

DAW

1 patch once a week for 3 weeks
Dispense 9 patches

Refill: 3

Podría recibir 3 meses de XULANE de una vez con un año de reabastecimiento. Solicítele a su médico que le recete 9 parches con 3 reabastecimientos.†

* El idioma y los requisitos pueden variar según la ley de su estado.

† Las farmacopeas varían y están sujetas a cambios sin aviso; consulte directamente con el plan para determinar la información más reciente. Esto no garantiza la cobertura ni el pago (total o parcial); el estado donde reside puede afectar la cobertura y la administración.

Consulte la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [breve resumen de información para el consumidor adjunto](#), incluida la **ADVERTENCIA en recuadro**.

Referencias: 1. XULANE Prescribing Information 03/22, Morgantown, WV; Mylan Pharmaceuticals Inc.

VIATRIS y el logotipo de Viatris son marcas comerciales de Mylan Inc., una compañía de Viatris. XULANE es una marca comercial registrada de Mylan Pharmaceuticals Inc., una compañía de Viatris.

VIATRIS ADVOCATE y el logotipo de Viatris Advocate son marcas comerciales registradas de Mylan Inc., una compañía de Viatris.

LOYALTYSCRIPT es una marca comercial registrada de McKesson Corporation.

© 2024 Viatris Inc. Todos los derechos reservados.
XUL-2022-0022 V3

